



GRUPO CAHT

GRUPO COOPERATIVO ARGENTINO
DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS



Tromboembolismo y embarazo

TIPS DE INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES

FACTORES DE RIESGO TROMBOEMBÓLICOS EN EL EMBARAZO SUBVALORADOS (I)



En publicaciones del CAHT se remarcó la importancia de la valoración de los factores de riesgo no-clásicos de enfermedad tromboembólica venosa (EDEV) durante el embarazo. La cesárea presenta un riesgo de 2-4 veces mayor de EDEV que el parto vaginal. El sobrepeso y la obesidad son otros factores que en ocasiones son subvalorados. El riesgo de EDEV aumenta conforme el IMC supera los 25 Kg/m². La obesidad duplica y la obesidad mórbida cuadruplica el riesgo de complicación trombótica. El síndrome metabólico es otro importante factor de riesgo, con una comprobada influencia de dos de sus componentes: la obesidad central y la hiperglucemia pre-gestacional.

Bibliografía:

María Mónica González Alcántara. Factores de riesgo trombóticos subvalorados. Hemostasia y Trombosis en la Mujer: tromboembolismo venoso en embarazo y técnicas de reproducción asistida. Pag. 39-48. Grupo CAHT, 2018.