



GRUPO CAHT

GRUPO COOPERATIVO ARGENTINO
DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

Tromboembolismo de pulmón

TIPS DE INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES

¿LA SEVERIDAD DEL TROMBOEMBOLISMO DE PULMÓN ES UN FACTOR ASOCIADO A LA RECURRENCIA?



Un estudio retrospectivo francés evaluó la asociación de la recurrencia trombótica con la severidad del primer evento de tromboembolismo de pulmón (TEP), luego de la suspensión de la terapia anticoagulante. Se determinó la severidad del TEP según la detección de compromiso cardíaco. A 5 años, el riesgo de recurrencia fue mayor en los pacientes con TEP severo. También, en el análisis multivariado, la severidad del TEP se asoció independientemente con el riesgo de recurrencia (HR 1,634 (1,015–2,632), $p=0,043$). Son necesarios estudios prospectivos para confirmar estos hallazgos.

Bibliografía:

Ferrari E, Fourrier E, Asarisi F, et al. Is pulmonary embolism recurrence linked with the severity of the first event? A French retrospective cohort study. *BMJ Open*. 2021 ;11(9):e050910. doi: 10.1136/bmjopen-2021-050910.