



GRUPO CAHT

GRUPO COOPERATIVO ARGENTINO  
DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

# Alteraciones congénitas de la función plaquetaria

## TIPS DE INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES

### MANEJO DE PACIENTES CON TROMBASTENIA DE GLANZMANN EMBARAZADAS



La trombostenia de Glanzmann (TG) es una alteración rara de la función de las plaquetas causada por un déficit cuanti o cualitativo de la integrina IIbIIIa. El manejo en el parto vaginal o cesárea constituye un desafío terapéutico. Para definir el abordaje debe considerarse el fenotipo sangrador de la paciente, la refractariedad plaquetaria, la presencia de anticuerpos anti IIbIIIa y HLA, y la disponibilidad de recursos, entre otros factores. En las pacientes que NO tengan refractariedad plaquetaria o autoanticuerpos se sugiere la transfusión de plaquetas una hora antes del parto vaginal/cesárea, y en las que SI posean estas complicaciones se sugiere el empleo de factor VII recombinante.

#### Bibliografía:

Fiore M, Sentilhes L, d'Oiron R. How I manage pregnancy in women with Glanzmann thrombasthenia. Blood 2022. 28 ; 139:2632-41. doi: 10.1182/blood.2021011595.