



GRUPO CAHT  
GRUPO COOPERATIVO ARGENTINO  
DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

# Anticoagulantes dicumarínicos

## TIPS DE INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES

### MANEJO DE PACIENTES CON RIN LIGERAMENTE FUERA DE RANGO: CAMBIO DE DOSIS VERSUS CONDUCTA EXPECTANTE



Un estudio desarrollado con información de la base de datos Michigan Anti-coagulation Quality Improvement Initiative (MAQI) incluyó a pacientes con RIN ligeramente fuera de rango (definido por los autores como RIN entre 1,5 y 1,99 o entre 3,01 y 3,49). Un grupo de pacientes en el que se modificó la dosis de warfarina se comparó con un grupo en el que se tomó una conducta expectante. En el siguiente control, fue discretamente más probable detectar un valor de RIN en rango adecuado (2-3) en el grupo de pacientes con modificación de dosis (58,9% vs. 60%,  $p=0,024$ ). Los autores plantean que la diferencia detectada fue mínima y que una conducta expectante puede ser adecuada en estos casos, ya que los constantes cambios de dosis no favorecen la adherencia de los pacientes. Consideramos que es muy importante evaluar los casos de manera individual, teniendo en cuenta los riesgos de trombosis y sangrado, y las características clínicas y conductuales de los pacientes.

#### Bibliografía:

Remer HB, Gu X, Haymart B, y col. Management strategies following slightly out-of-range INRs: watchful waiting vs. dose changes. Blood Adv 2022; 6: 2977-80. doi: 10.1182/bloodadvances.2021006454.