



GRUPO CAHT
GRUPO COOPERATIVO ARGENTINO
DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

Manejo hemostático perioperatorio/periprocedimiento

TIPS DE INFORMACIÓN

PARA PROFESIONALES

GUÍAS PARA EL MANEJO ANTITROMBÓTICO PERIOPERATORIO (PARTE I)



En el 2022, la ACCP (American College of Chest Physicians) publicó guías clínicas para el manejo antitrombótico perioperatorio. Destacamos algunas recomendaciones:

- **Recomendación 5:** En pacientes con **reemplazo valvular mecánico** anticoagulados con dicumarínicos, quienes requieren interrupción de la terapia para una cirugía o procedimiento programado las guías, recomiendan **EN CONTRA** de la utilización de terapia puente con heparina (Recomendación condicional, muy bajo nivel de evidencia).
- **Recomendación 6:** En pacientes con **fibrilación auricular** anticoagulados con dicumarínicos, quienes requieren interrupción de la terapia para una cirugía o procedimiento programado las guías, recomiendan **EN CONTRA** de la utilización de terapia puente con heparina (Recomendación fuerte, nivel moderado de evidencia).
- **Recomendación 14:** En pacientes anticoagulados con dicumarínicos y que se encuentren en plan de colocación de un **cardiodesfibrilador implantable**, el panel recomienda **no suspender dicumarínicos** por sobre interrupción y realizar terapia puente con heparina (Recomendación fuerte, nivel moderado de evidencia).

Bibliografía:

Douketis JD y col. Perioperative Management of Antithrombotic Therapy: An American College of Chest Physicians Clinical Practice Guideline. Chest 2022; 162: e207.