



GRUPO CAHT  
GRUPO COOPERATIVO ARGENTINO  
DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS



# Manejo hemostático perioperatorio/periprocedimiento

## TIPS DE INFORMACIÓN PARA PACIENTES

### ¿SIEMPRE ES NECESARIO UTILIZAR HEPARINA PREVIA A LOS PROCEDIMIENTOS, EN QUIENES RECIBEN ANTICOAGULANTES DICUMARÍNICOS POR TROMBOSIS?



La respuesta es **NO**. Según guías clínicas internacionales publicadas en 2022, no todos los pacientes anticoagulados con dicumarínicos (acenocumarol o warfarina) debido a una trombosis deben recibir “terapia puente” con enoxaparina cuando se realiza una suspensión transitoria del anticoagulante previo a una cirugía o procedimiento. Sí debe realizarse la “terapia puente” cuando el riesgo de una nueva trombosis es muy alto en el período en que se suspende el acenocumarol o la warfarina. Ese riesgo debe ser definido por el profesional de la salud experto en la materia.

#### Bibliografía:

Douketis JD y col. Perioperative Management of Antithrombotic Therapy: An American College of Chest Physicians Clinical Practice Guideline. Chest 2022; 162: e207.