



GRUPO CAHT
GRUPO COOPERATIVO ARGENTINO
DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

Sangrado

TIPS DE INFORMACIÓN

PARA PROFESIONALES

SANGRADO OBSTÉTRICO: EvW Y OTROS TRASTORNOS HEMORRÁGICOS HEREDITARIOS



Las mujeres con trastornos hemorrágicos hereditarios tienen un mayor riesgo de hemorragia durante el embarazo, el parto y el puerperio. El manejo clínico requiere el reconocimiento de estos trastornos, el alto riesgo de hemorragia posparto y un enfoque multidisciplinario personalizado que incluya al paciente en la toma de decisiones.

Cuando el feto tiene un trastorno hemorrágico confirmado o el riesgo de heredarlo, es necesario considerar el riesgo de hemorragia fetal y neonatal.

Pacientes embarazadas con estos trastornos, a menudo necesitan tomar decisiones en ausencia de evidencia de alto nivel de certeza.

Se presenta el caso de una paciente embarazada con enfermedad de von Willebrand que llegó a tomar decisiones en varios puntos en los que actualmente existe ambigüedad clínica debido a la falta de evidencia de alto nivel de certeza. Para cada etapa de su atención, desde el diagnóstico hasta el posparto, se discutió la literatura actual y se describió el enfoque. También se realizó una descripción general de consideraciones en otros trastornos hemorrágicos hereditarios y el embarazo.

Bibliografía:

Johnsen, J. M., & MacKinnon, H. J. (2022). JTH in Clinic - Obstetric bleeding: VWD and other inherited bleeding disorders. *Journal of thrombosis and haemostasis: JTH*, 20(7), 1568-1575. <https://doi.org/10.1111/jth.15770>.