



GRUPO CAHT
GRUPO COOPERATIVO ARGENTINO
DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

Hemofilia

TIPS DE INFORMACIÓN

PARA PROFESIONALES

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y DE TRATAMIENTO DE LACTANTES Y NIÑOS PEQUEÑOS MENORES DE DOS AÑOS CON HEMOFILIA



Los bebés y niños pequeños menores de 2 años (BNP) con hemofilia tienen características de sangrado únicas. La profilaxis con factores ha demostrado que disminuye el riesgo de hemorragia intracraneal (HIC) lo que respalda las recomendaciones para comenzar el tratamiento a una edad temprana.

Se analizaron las características clínicas y demográficas de 883 BNP con hemofilia A y B de Centros de Tratamiento de Hemofilia en EE. UU inscritos en el programa de vigilancia en Centros para Enfermedades Control y Prevención (CDC).

Se observó un 8% de HIC en los BNP, de los cuales 8 (12%) estaban en profilaxis continua en el momento de la HIC.

Los BNP en este estudio comenzaron la profilaxis dentro del primer año de vida (media 10,3 meses). En comparación con aquellos sin historia familiar (FH) de hemofilia, la FH positiva conocida de hemofilia se asoció con una edad más temprana de diagnóstico ($p < 0,0001$) y disminución de las tasas de parto vaginal ($p = 0,0006$). El uso de miméticos FVIII y la profilaxis con factores de coagulación de vida media prolongada aumentaron en las cohortes de nacimiento tardíos de BNP con hemofilia A.

El estudio destaca la necesidad de realizar más investigaciones para identificar factores de riesgo modificables para prevenir la HIC mediante un diagnóstico temprano y el inicio temprano de la profilaxis, incluso dentro del primer mes de vida.

Bibliografía:

Han, J. H., Dupervil, B., Mahajerin, A., Kulkarni, R., Manco-Johnson, M. J., & Thornburg, C. D. (2024). Clinical and treatment characteristics of infants and toddlers less than two years of age with hemophilia. *Blood advances*, bloodadvances.2023012486. Advance online publication. <https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2023012486>.