



GRUPO CAHT
GRUPO COOPERATIVO ARGENTINO
DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

Hemofilia

TIPS DE INFORMACIÓN

PARA LA COMUNIDAD

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y DE TRATAMIENTO DE LACTANTES Y NIÑOS PEQUEÑOS MENORES DE DOS AÑOS CON HEMOFILIA



Los bebés y niños pequeños menores de 2 años (BNP) con hemofilia tienen características de sangrado únicas. La profilaxis con factores de coagulación ha demostrado que disminuye el riesgo de hemorragia intracraneal (HIC), lo que respalda las recomendaciones para comenzar el tratamiento a una edad temprana.

Se analizaron 883 BNP con hemofilia A y B de Centros de Tratamiento de Hemofilia en EE.UU.

Se observó un 8% de hemorragia intracraneal en estos niños, de los cuales 8 (12%) estaban con tratamiento preventivo en el momento de dicha hemorragia.

Este estudio destaca la necesidad de realizar más investigaciones para identificar factores de riesgo modificables para prevenir la HIC mediante un diagnóstico temprano y el inicio temprano de la profilaxis, incluso dentro del primer mes de vida.

Bibliografía:

Han, J. H., Dupervil, B., Mahajerin, A., Kulkarni, R., Manco-Johnson, M. J., & Thornburg, C. D. (2024). Clinical and treatment characteristics of infants and toddlers less than two years of age with hemophilia. *Blood advances*, bloodadvances.2023012486. Advance online publication. <https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2023012486>.