



GRUPO CAHT
GRUPO COOPERATIVO ARGENTINO
DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

DOACs TIPS DE INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES

DOACs EN PACIENTES CON CIRUGÍA BARIÁTRICA



Recientemente, el subcomité de control de anticoagulación de la ISTH realizó una comunicación sobre el uso de DOACs en pacientes obesos. Respecto a los pacientes con cirugía bariátrica se detalla:

	Sitio de absorción	Absorción en banda gástrica	Absorción en gastrectomía parcial/ manga gástrica	Absorción en Y de Roux
Apixabán	Principalmente en tracto gastrointestinal alto, posible absorción en el colon	Probablemente no afectada	Probablemente no afectada	Posiblemente reducida
Rivaroxabán	Principalmente en el estómago	Posiblemente reducida	Posiblemente reducida	Posiblemente reducida
Dabigatrán	Estómago distal e intestino delgado proximal	Posiblemente reducida	Posiblemente reducida	Posiblemente reducida

El panel sugiere evitar los DOACs para la prevención o tratamiento de ETV en las primeras cuatro semanas desde la cirugía bariátrica, por la posible disminución en la absorción. Luego de ese período podrían emplearse si se realiza control del nivel plasmático del anticoagulante.

Bibliografía:

Martin KA y col. J Thromb Haemost 2021; 19(8): 1874-82.
doi: 10.1111/jth.15358.