



GRUPO CAHT

GRUPO COOPERATIVO ARGENTINO  
DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS



# Tromboembolismo y embarazo

## TIPS DE INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES

### FACTORES DE RIESGO TROMBOEMBÓLICOS EN EL EMBARAZO SUBVALORADOS (I)



En publicaciones del CAHT se remarcó la importancia de la valoración de los factores de riesgo no-clásicos de enfermedad tromboembólica venosa (ETE) durante el embarazo. La cesárea presenta un riesgo de 2-4 veces mayor de ETE que el parto vaginal. El sobrepeso y la obesidad son otros factores que en ocasiones son subvalorados. El riesgo de ETE aumenta conforme el IMC supera los 25 Kg/m<sup>2</sup>. La obesidad duplica y la obesidad mórbida cuadruplica el riesgo de complicación trombótica. El síndrome metabólico es otro importante factor de riesgo, con una comprobada influencia de dos de sus componentes: la obesidad central y la hiperglucemia pre-gestacional.

---

#### Bibliografía:

María Mónica González Alcántara. Factores de riesgo trombóticos subvalorados. Hemostasia y Trombosis en la Mujer: tromboembolismo venoso en embarazo y técnicas de reproducción asistida. Pag. 39-48. Grupo CAHT, 2018.