



GRUPO CAHT

GRUPO COOPERATIVO ARGENTINO
DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

Alteraciones congénitas de la función plaquetaria

TIPS DE INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES

MANEJO DE PACIENTES CON TROMBASTENIA DE GLANZMANN EMBARAZADAS



La trombostenia de Glanzmann (TG) es una alteración rara de la función de las plaquetas causada por un déficit cuanti o cualitativo de la integrina IIbIIIa. El manejo en el parto vaginal o cesárea constituye un desafío terapéutico. Para definir el abordaje debe considerarse el fenotipo sangrador de la paciente, la refractariedad plaquetaria, la presencia de anticuerpos anti IIbIIIa y HLA, y la disponibilidad de recursos, entre otros factores. En las pacientes que NO tengan refractariedad plaquetaria o autoanticuerpos se sugiere la transfusión de plaquetas una hora antes del parto vaginal/cesárea, y en las que SI posean estas complicaciones se sugiere el empleo de factor VII recombinante.

Bibliografía:

Fiore M, Sentilhes L, d'Oiron R. How I manage pregnancy in women with Glanzmann thrombasthenia. Blood 2022. 28 ; 139:2632-41. doi: 10.1182/blood.2021011595.