



GRUPO CAHT

GRUPO COOPERATIVO ARGENTINO  
DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

# Coagulopatía de la cirrosis

## TIPS DE INFORMACIÓN PARA PACIENTES

### UTILIDAD DEL RIN EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA HEPÁTICA



El RIN (Razón Internacional Normalizada) se utiliza para monitorear a los pacientes anticoagulados con dicumarínicos (acenocumarol o Warfarina). Además, tiene valor en la evaluación de los pacientes con insuficiencia hepática/cirrosis. En estas enfermedades, descienden los factores de la coagulación formados en el hígado provocando aumento en el RIN. Una de las escalas más utilizadas para definir el grado de severidad de la insuficiencia hepática se llama MELD (del inglés Model for End-Stage Liver Disease), la cual utiliza al RIN como uno de sus parámetros principales. La escala MELD es uno de los elementos empleados para definir prioridades en las listas de trasplante hepático.

#### Bibliografía:

Peng Y, Qi X, Guo X. Child-Pugh Versus MELD Score for the Assessment of Prognosis in Liver Cirrhosis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. *Medicine (Baltimore)* 2016; 95: e2877. doi: 10.1097/MD.0000000000002877.