



GRUPO CAHT
GRUPO COOPERATIVO ARGENTINO
DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

Tópicos destacados Congreso CAHT 2022 TIPS DE INFORMACIÓN PARA PACIENTES

ANTICOAGULACIÓN EN PACIENTES CON CÁNCER Y PLAQUETAS BAJAS



Como mencionamos en tips previos, existe una fuerte asociación entre cáncer y trombosis. Por esta razón, es frecuente que los pacientes con cáncer necesiten anticoagulación. En ocasiones, los pacientes con cáncer tienen un recuento de plaquetas bajo, debido a la quimioterapia, inmunoterapia, o inclusive, al compromiso de la enfermedad oncológica. Esta situación aumenta el riesgo de sangrado y debe ser evaluada con atención. Se recomienda que con un recuento de plaquetas menor a $30.000/\text{mm}^3$ no se administre ningún tipo de anticoagulante. La mayoría de los pacientes con más de $50.000/\text{mm}^3$ pueden recibir tratamiento anticoagulante con seguridad. Entre 30 y 50.000 plaquetas $/\text{mm}^3$ pueden utilizarse anticoagulantes en dosis bajas, preferentemente parenterales, como la heparina no fraccionada o la enoxaparina.

Bibliografía:

Trombosis en el paciente con cáncer. Sesión V. Libro Educativo XV Congreso Argentino de Hemostasia y Trombosis del Grupo CAHT y VI Curso Educativo ISTH, 2022.

Farge D, Frere C, Connors JM y col. International Initiative on Thrombosis and Cancer (ITAC) advisory panel. 2019 international clinical practice guidelines for the treatment and prophylaxis of venous thromboembolism in patients with cancer. *Lancet Oncol* 2019; 20(10): e566-e581.