



GRUPO CAHT  
GRUPO COOPERATIVO ARGENTINO  
DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

# Manejo hemostático perioperatorio/periprocedimiento

## TIPS DE INFORMACIÓN

### PARA PROFESIONALES

#### GUÍAS PARA EL MANEJO ANTITROMBÓTICO PERIOPERATORIO (PARTE I)



En el 2022, la ACCP (American College of Chest Physicians) publicó guías clínicas para el manejo antitrombótico perioperatorio. Destacamos algunas recomendaciones:

- Recomendación 5:** En pacientes con **reemplazo valvular mecánico** anticoagulados con dicumarínicos, quienes requieren interrupción de la terapia para una cirugía o procedimiento programado las guías, recomiendan **EN CONTRA** de la utilización de terapia puente con heparina (Recomendación condicional, muy bajo nivel de evidencia).
- Recomendación 6:** En pacientes con **fibrilación auricular** anticoagulados con dicumarínicos, quienes requieren interrupción de la terapia para una cirugía o procedimiento programado las guías, recomiendan **EN CONTRA** de la utilización de terapia puente con heparina (Recomendación fuerte, nivel moderado de evidencia).
- Recomendación 14:** En pacientes anticoagulados con dicumarínicos y que se encuentren en plan de colocación de un **cardiodesfibrilador implantable**, el panel recomienda **no suspender dicumarínicos** por sobre interrupción y realizar terapia puente con heparina (Recomendación fuerte, nivel moderado de evidencia).

#### Bibliografía:

Douketis JD y col. Perioperative Management of Antithrombotic Therapy: An American College of Chest Physicians Clinical Practice Guideline. Chest 2022; 162: e207.